Tubes de citrate
pour tests de coagulation

Permet la détermination du temps de prothrombine jusqu'à 12h après le prélèvement

- tubes en polypropylène avec bouchon
- dimensions : Ø13 x 75 mm
- citrate tamponné à pH, stable, concentré à 3,8% ou 3,2%
- proportion citrate / sang : 1 / 9
- anticoagulant liquide
- étiquetés avec numéro de lot et date de péremption
- livrés en plateau portoir plastique de 100 tubes

cap.	dim.	anticoagulant	référence	Prix HT
2,5 ml	Ø13 x 75 mm	3,8%	**AX3410**	
2,5 ml	Ø13 x 75 mm	3,2%	**AX3411**	
4 ml	Ø13 x 75 mm	3,8%	**AX3412**	

Tube de citrate
pour vitesse de sédimentation

- tubes en polypropylène avec bouchon
- citrate : anticoagulant, action par fixation du calcium, préparé à 3,8% d'après la norme ISO 6710 : 1995
- proportion citrate / sang : 1 volume / 4 volumes
- contiennent 1,4 ml de solution stable
- étiquetés avec numéro de lot et date de péremption
- livrés en plateau portoir plastique

capacité	dimensions	référence	Prix HT
2 ml	Ø13 x 75 mm	**AX3460** les 100	

Tubes pour sérum
avec accélérateur et gel

- tubes en polypropylène avec bouchon
- tubes traités avec un accélérateur pulvérisé pour la formation d'un caillot à rétraction rapide
- obtention du sérum à partir de 15 minutes
- gel au fond du tube : permet la séparation du caillot et du sérum après centrifugation ; permet d'obtenir 15 à 20% de sérum supplémentaire par rapport aux tubes avec granulés ou en verre
- étiquetés avec numéro de lot et date de péremption
- livrés en plateau portoir plastique

capacité	dimensions	référence	Prix HT
4 ml	Ø13 x 75 mm	**AX3420** les 100	
9 ml	Ø16 x 100 mm	**AX3421** les 120	

Tubes pour sérum
avec accélérateur et granules

- tubes en polypropylène avec bouchon
- tubes traités avec un accélérateur pulvérisé pour la formation d'un caillot à rétraction rapide
- obtention du sérum à partir de 12 minutes
- granules inertes au fond du tube : permet la séparation du caillot et du sérum après centrifugation ; permet d'éviter la rupture des cellules (hémolyse) lors de la centrifugation
- étiquetés avec numéro de lot et date de péremption

capacité	dimensions	référence	Prix HT
4 ml	Ø13 x 75 mm	**AX3425** les 1000	
9 ml	Ø16 x 100 mm	**AX3426** les 500	
granules de rechange			
Flacon de granules, 750 g		**AX3427** les 20	

Héparine de lithium

- tubes en polypropylène avec bouchon
- héparine : anticoagulant qui inhibe l'action de la thrombine
- anticoagulant pulvérisé à l'intérieur du tube, mélange rapide avec le sang
- étiquetés avec numéro de lot et date de péremption
- livrés en portoir plastique

capacité	dimensions	référence	Prix HT
2,5 ml	Ø13 x 75 mm	**AX3430** les 100	
4 ml	Ø13 x 75 mm	**AX3431** les 100	

Héparine de lithium et iodoacétate

Glucose stable pendant 4 jours

- tubes en polypropylène avec bouchon
- héparine : anticoagulant qui inhibe l'action de la thrombine
- iodoacétate : conservateur pour glucose
- anticoagulant pulvérisé à l'intérieur du tube, mélange rapide avec le sang
- étiquetés avec numéro de lot et date de péremption
- livrés sous sachet de couleur noire, en portoir plastique

capacité	dimensions	référence	Prix HT
2,5 ml	Ø13 x 75 mm	**AX3435** les 100	
4 ml	Ø13 x 75 mm	**AX3436** les 100	

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.06.2017, sans engagement