Sprays désinfectants rapides

DM IIa directive 93/42

ANIOSPRAY SURF 41
séchage rapide

Performances :
- virucide
- bactéricide
- mycobactéricide
- fongicide
- levuricide

- **41% d'alcool**
- **séchage rapide**

- produits biocides
- désinfection des surfaces, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs, préalablement nettoyés
- pulvériser uniformément (80 ml/m²), rinçage inutile, sauf si la surface entre en contact avec la peau ou les muqueuses

Propriété microbiologiques :
- **bactéricide** : EN1040, EN13727, EN 13697, T 72-281
- **mycobactéricide** : EN 14348, EN 13697
- **levuricide** : EN 1275, EN 13624, EN 13697, T 72-281
- **fongicide** : EN 1275, EN 13624, EN 13697
- **virucide** : PRV (Virus modèle HCV), BVDV (Virus modèle HBV), HSV, Vaccinia virus

référence	Prix HT
DA2318 Bidon de 5 litres, l'unité	
DA3320 Pulvérisateur pour flacon 1 litre, l'unité	

Les performances des désinfectants et antiseptiques

Normes de base

Pour mesurer l'efficacité des désinfectants, des normes de base définissent :

- l'action du désinfectant sur des micro-organismes déterminés, ce qui permet de spécifier **le spectre d'activité** : bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, levuricide ou sporicide
- **le temps de contact** nécessaire
- **la température** d'utilisation
- **les conditions d'utilisation** : "en condition de propreté", "en condition de saleté", "en présence d'eau dure", etc.
- **la concentration** du produit

Normes d'application

En plus de ces bases, des normes d'application, différentes selon le domaine d'activité, précisent les conditions d'application du désinfectant pour un usage donné

Spectre	Phase 1 : normes de base	Phase 2 : normes d'application	
		essais en suspension	essais sur des surfaces
agroalimentaire, industrie, usage domestique, collectivités			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 1276	NF EN 13697
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 1650	NF EN 13697
Sporicide	NF EN 14347	NF EN 13704	-
vétérinaire			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 1656	NF EN14349 / NF EN16437
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 1657	NF EN16438
Mycobactéricide	-	NF EN 14204	-
Virucide	-	NF EN 14675	-
médecine humaine			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 13727	NF EN 14561 / NF EN 16615
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 13624	NF EN 14562 / NF EN 16615
Mycobactéricide	-	NF EN 14348	NF EN 14563
Virucide	-	NF EN 14476	-
autres domaines			
Bactéricide	NF EN 1040	-	NF EN 1499 / NF EN 1500 / NF EN 12791

** fongicide = action contre les levures ET les moisissures*

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50
Prix HT départ au 01.09.2019, sans engagement

ANIOSPRAY SURF 41

Désinfectant à pulvériser



- Actif sur virus enveloppés en 1 minute
- Large compatibilité avec les matériaux
- Séchage rapide et sans trace
- Ne laisse pas de film gras après pulvérisation

INDICATIONS

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie ...).

CARACTERISTIQUES

- Produit prêt à l'emploi
- Solution limpide incolore
- Densité à +20°C : env 0.950
- pH à +20°C : env. 6.0
- Pourcentage d'éthanol : 41% v/v
- Point éclair : +26.5°C
- Non corrosif et non oxydant
- 1 Pression de pulvérisateur délivre 1ml de produit

PRÊT A L'EMPLOI

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

ENGAGEMENT ANIOSAFE

ANIOSPRAY SURF 41

Désinfectant à pulvériser

MODE D'EMPLOI



Nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant type SURFANIOS Premium.

Pulvériser uniformément sur les surfaces verticales et les dispositifs médicaux puis le mobilier, du fond de la pièce, jusqu'à la sortie.
Appliquer en quantité suffisante (80 ml/m²).

Le rinçage est inutile, sauf si les zones à traiter sont destinées à être en contact avec la peau et les muqueuses; respecter alors le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée (laisser porte et fenêtres fermées). S'assurer que les surfaces restent humides pendant toute la durée d'action. (Aérer si possible avant réutilisation).

COMPOSITION

Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 327 mg/g), N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 1.4 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 1.1 mg/g), excipients.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
Utilisez les biocides avec précaution. Avant tout utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Stockage : entre +5°C et +25°C.
Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2) et dispositif médical de classe IIa - usage réservé aux professionnels.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

ANIOSPRAY SURF 41 est conforme à la norme NF T 72-281 (bactéricide, levuricide) en 5 minutes de contact à la dose de 80ml/m²

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727, EN 13697 NF T 72-281	**5 minutes**
Mycobactéries	EN 14348, EN 13697	**15 minutes**
Levures	EN 1275, EN 13624, EN 13697 NF T 72-281	**5 minutes**
Moisissures	EN 1275, EN 13624, EN 13697	**15 minutes**
Virus	PRV (virus modèle HCV), BVDV (virus modèle HBV), HSV, Vaccinia virus	**1 minute**

Le Robert Koch Institute recommande l'utilisation de désinfectants avec la revendication "begrenzt viruzid wirksan", soit activité virucide limitée, pour interrompre la chaîne de transmission. Selon cet Institut, l'activité virucide limitée correspond à une activité sur virus de la vaccine et BVDV.

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com
Tél. 01 42 50 50 50
Prix HT départ au 01.09.2019, sans engagement